



მარწყვის მავნებელ-დაავადებებისაგან დაცვის  
ფენოკალენდარული სქემა

2023

	პერიოდი	ღონისძიება/მავნებელი	პრეპარატი (მოქმედი ნივთიერება)	ხარჯვის ნორმა	
1	ვეგეტაციის დასაწყისი	ფომოფისი, ფიტოფტორა, სილაქავეები	კუპროქსატი (სამფუძიანი სპილენძის სულფატი)	5 ლ/ჰა	
			ბორდო ფლო (ბორდოს ნარევი 20%)	6 ლ/ჰა	
			ბორდო კაფარო (ბორდოს ნარევი 20%)	6 კგ/ჰა	
			კუპერვალი (ბორდოს ნარევი 20%)	6 კგ/ჰა	
		ბუგრები, კოკრიჭამია, ხერხია, ფოთოლჭამია	სილტაკი (ჰეპტამეთილ ტრისილოქსანი)	0.6-0.7 ლ/ჰა	
			ნურელ დ (ქლორპირიფოსი+ ციპერმეტრინი)	2 ლ/ჰა	
			დეცის ფლუქსი (დელტამეტრინი)	0.5 ლ/ჰა	
			ალპაკი (ალფა-ციპერმეტრინი)	0.2 ლ/ჰა	
			ფომოფისი, ფიტოფტორა, სილაქავეები	კოსაიდ 2000 (სპილენძის ჰიდროქსიდი)	3-4 კგ/ჰა
				ბორდოფლო (ბორდოს ნარევი 20%)	6 ლ/ჰა
პოლტიგლია (ბორდოს ნარევი 20%)	6 კგ/ჰა				
იროკო (სპილენძის ჰიდროქსიდი)	3-4 კგ/ჰა				
2	საყვავილე ყლორტების გამოჩენა	ბუგრები, კოკრიჭამია, ხერხია, ფოთოლჭამია	არივო (ციპერმეტრინი)	0.35 ლ/ჰა	
			დეცის ფლუქსი (დელტამეტრინი)	0.5 ლ/ჰა	
			კარატე (ლამბდაციჰალოტრინი)	0.2 ლ/ჰა	
			კაისო (ლამბდა-ციჰალოტრინი)	0.8 კგ/ჰა	
		ფომოფისი, ფიტოფტორა, სილაქავეები	კოსაიდ 2000 (სპილენძის ჰიდროქსიდი)	3-4 კგ/ჰა	

		ტკიპები	ენვიდორი (სპიროდიკლოფენი)	0.4 ლ/ჰა
			ვერტიმევი (აბამექტინი)	1 ლ/ჰა
			მასაი (ტებუფენპირადი)	0.5 კგ/ჰა
			სილტაკი (ჰეპტამეთილ ტრისილოქსანი)	0.6-0.7 ლ/ჰა
3	ყვავილობის დასაწყისი, კოკრების გამოჩენა	ფომოფსისი, ფიტოფტორა, სილაქავეები	იროკო (სპილენძის ჰიდროქსიდი)	3-4 კგ/ჰა
			ბორდო კაფარო (ბორდოს ნარევი 20%)	6 კგ/ჰა
			ალიეტი (ალუმინის ფოსფატი)	4 კგ/ჰა
			ლუნა სენსეიშენი (ფლუოპირამი)	0.25-0.55 ლ/ჰა
	მავენბლების კომპლექსი	კალიფსო (თიაკლოპრიდი)	0,2 ლ/ჰა	
		სპინტორი (სპინოზადი)	0.3 ლ/ჰა	
		ვერტიმევი (აბამექტინი)	1 ლ/ჰა	
		ტალავი (ტებუფენპირადი)	0.4-0.5 კგ/ჰა	
4	სიმწიფის დასაწყისი	ნაცრისფერი სიდამპლე, ნაცარი	აფეტი (პენთიოპირადი)	1.5-1.75 ლ/ჰა
			ზატო (ტრიფლოქსისტრობინი)	0.15 კგ/ჰა
			სვიტჩი (ფლუდიოქსონოლი+ ციპროდინილი)	0.8-1.0 კგ/ჰა
			სერენადე (Bacillus subtilis)	4-8 ლ/ჰა
			სკალა (პირიმეთანილი)	0.8-1.0 ლ/ჰა
5	მოსავლის აღების შემდეგ	დაავადებების კომპლექსი	კუპროქსატი (სამფუძიანი სპილენძის სულფატი)	5 ლ/ჰა
			კოსაიდ 2000 (სპილენძის ჰიდროქსიდი)	3-4 კგ/ჰა
			კუპერვალი (ბორდოს ნარევი 20%)	6 კგ/ჰა
			ბორდოფლო (ბორდოს ნარევი 20%)	6 ლ/ჰა
	მავენბლების კომპლექსი	კარატე (ლამბდაციჰალოტრინი)	0.2 ლ/ჰა	
		დევის ფლუქსი (დელტამეტრინი)	0.5 ლ/ჰა	
		კალიფსო (თიაკლოპრიდი)	0,2 ლ/ჰა	
		არივო (ციპერმეტრინი)	0.35 ლ/ჰა	

**შენიშვნა:** ფენოსქემაში მოცემული პესტიციდები რეგისტრირებულია საქართველოში. წარმოდგენილი ფენოსქემა სარეკომენდაციო ხასიათისაა და შესაძლებელია მისი კორექტირება, ასევე პრეპარატების ჩანაცვლება სპეციალისტებთან შეთანხმებით კლიმატური პირობების, ზონალობის, პესტიციდების ასორტიმენტისა და გამოყენების რეგლამენტების გათვალისწინებით.